

مقایسه تأثیر ورزش‌های پیاده‌روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲

حمیده عظیمی^۱، لیلی یکه فلاح^۲، اعظم قربانی^۳

h.azimi88@yahoo.com

نویسنده‌ی مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی

دریافت: ۹۳/۰۲/۲۷ پذیرش: ۹۴/۰۶/۰۹

چکیده

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن بوده که بیماران مبتلا به دیابت به جهت ارتقاء کیفیت زندگی خود به برنامه مراقبتی ویژه‌ای نیاز دارند. داشتن بروزرسانی ملدون یکی از این برنامه‌هایی است که موجب بهبود اداره بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر ۴ هفته‌هه تمرينات یوگا و پیاده‌روی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی ۶۰ مرد و زن مبتلا به دیابت ۳۰ تا ۵۵ ساله به صورت تصادفی ساده به سه گروه یوگا، پیاده‌روی و کنترل تقسیم شدند. گروه یوگا و پیاده‌روی به مدت ۴ هفته هر روز به مدت ۴۵ دقیقه تحت مداخله قرار گرفتند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه SF-36 در دو نوبت قبل و پایان مداخله جمع آوری شدند. آنالیز آماری داده‌ها با نرم افزار ۱۶ SPSS در سطح معنی‌داری ۹۵ درصد انجام شد. یافته‌ها: در مقایسه کیفیت زندگی گروه یوگا با کنترل، ابعاد عملکرد جسمانی-نقش جسمانی-سلامتی عمومی-سرزندگی-عملکرد اجتماعی-نقش روانی و سلامت روانی در گروه یوگا بهبود معنی‌دار داشتند ($P < 0.05$). در مقایسه کیفیت زندگی گروه پیاده‌روی با گروه کنترل، ابعاد عملکرد و نقش روانی-سلامتی عمومی-سرزندگی-نقش و سلامت روانی در گروه پیاده‌روی بهبود معنی‌دار داشتند ($P < 0.05$). در بررسی همزممان ابعاد کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در سه گروه، در ابعاد عملکرد و نقش جسمانی-سلامتی عمومی-سرزندگی-نقش و سلامت روانی تفاوت معنی‌دار در گروه‌های مداخله مشاهده شد ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: ورزش یوگا در ارتقاء بعد سلامت عمومی کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش پیاده‌روی است در حالیکه ورزش یوگا در بهبود سایر ابعاد کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش یوگا است.

وازگان کلیدی: یوگا، پیاده‌روی، ورزش، کیفیت زندگی، دیابت ملیتوس، ایران

مقدمه

در طول زندگی و عوامل وراثتی می‌باشد که هر دو با هم تصور ذهنی فرد از خوب یا ضعیف بودن کیفیت زندگی را می‌سازند (۲).

زمانی که فردی در زندگی احساس رضایت و خوشحالی می‌کند و از بیماری خود احساس نارضایتی ندارد انرژی بیشتری برای مراقبت از خود صرف می‌کند و زمانی که فرد خود مراقبتی خوبی داشته باشد روز به روز احساس بهتری داشته و کیفیت زندگی بهتری نیز خواهد داشت (۲). بین بیماری و کیفیت زندگی یک ارتباط متقابل وجود دارد چرا که

از سال ۱۹۴۸ زمانی که سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را این گونه تعریف کرد "سلامتی تنها فقدان بیماری و ناتوانی نیست بلکه سلامتی عبارت است از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی"، موضوع کیفیت زندگی در بخش بالینی و تحقیقی مراقبت بهداشتی اهمیت بسیاری یافته است (۱).

تعریف کیفیت زندگی امر مشکلی است چرا که مفهومی وسیع و پیچیده دارد که با داشتن احساس خوشحالی و رضایت شناسایی می‌شود. شخصیت سالم، آمیزه‌ای از تجربیات فردی

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲-دکتری پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۳-کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ورزش با کاهش اضطراب باعث افزایش خود باوری و خودکفایی می‌شود. بر اساس برخی گزارشات افزایش خود باوری ممکن است مربوط به تنظیم سیستم آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق می‌افتد (۱۰). یکی از این ورزش‌ها ورزش یوگا است (۱۱). یوگا به مجموعه‌ای از تمرینات فیزیکی، وضعیت گزینی (pranayama) و تمرینات کترل شدّه تنفسی (asana)، تمرینات رها سازی و تن آرامی (shavasana) گفته می‌شود (۱۱،۱۲). تمرینات جسمی و تنفسی یوگا انعطاف پذیری و قدرت عضلانی را افزایش می‌دهد، گردش خون، جذب اکسیژن و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می‌بخشد. به علاوه آرام سازی و رهاسازی مدیتیشن در یوگا باعث ثبت سیستم عصبی اتونومیک، کترل عواطف و باعث بهبود احساس سلامتی در فرد می‌شود (۱۲). همچنین در ورزش یوگا تمامی مفاصل در حد کمال استفاده می‌شوند و بر اساس برخی گزارشات تأثیری که یوگا در کاهش درد، خستگی، آشفتگی خواب، اوره سرم، کراتینین، کلسترول، قند خون، لیپید خون، کورتیزول و استرس دارد، نسبت به سایر ورزش‌ها تواناتر است (۱۳).

نتایج کارآزمایی‌های بالینی نشان داده که کیفیت زندگی می‌تواند به عنوان شاخص کیفیت مراقبت‌های بهداشتی باشد و جزوی از برنامه درمان بیماری‌ها محسوب شود و اندازه گیری آن در بیماری‌های مزمن، اطلاعات بیشتری را در مورد وضعیت سلامتی و بیماری در اختیار مان قرار می‌دهد (۱۴،۱۵).

مطالعات متعدد تأیید نمودند که انجام ورزش در بیماران مبتلا به دیابت موجب افزایش میانگین نمرات حیطه‌های جسمانی روانی-اجتماعی کیفیت زندگی در مقایسه با گروه کترل می‌گردد (۱۶) و جیوتستنا (Jyotsna) در مطالعه خود گزارش کرد که بعد از انجام ۳ ماه تمرینات ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت، میانگین نمرات حیطه‌های روانی و اجتماعی در گروهی که تمرینات یوگا را داشته‌اند با گروه کترل افزایش

علایم بیماری اثر مستقیم روی تمام جنبه‌های کیفیت زندگی دارد. طبق نظر انجمن دیابت آمریکا یکی از بیماری‌های مزمنی که سبب بروز مشکلات جسمی-روانی در افراد می‌گردد دیابت ملیتوس است (۲).

دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین به گروهی از اختلالات متابولیکی گفته می‌شود که با افزایش سطح گلوکز خون به علت اختلال در ترشح انسولین، عملکرد انسولین یا هر دو ایجاد می‌شود (۳).

برخی مطالعات نشان می‌دهند که شیوع دیابت نوع ۲ به دلیل افزایش چاقی و کاهش فعالیت بدنی به سرعت در حال افزایش است (۴) و هم اکنون بیش از ۳۱۱ میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند و در سال ۲۰۳۰ به ۴۷۰ میلیون نفر خواهد رسید (۵). شیوع دیابت نوع ۲ در آسیا از ۱/۲ درصد به ۱۴/۶ درصد و در خاورمیانه از ۴/۶ درصد به ۴۰ درصد و در ایران از ۱/۳ درصد به ۱۴/۷ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است (۶).

دیابت می‌تواند بر عملکرد فیزیکی و جسمی، توسعه عوارض بیماری، وضعیت روحی و روانی، ارتباطات فردی، خانوادگی و اجتماعی، عملکرد جنسی و درک از سلامتی تأثیرگذار باشد (۷). بیماری بر روابط اجتماعی و شغل اثر گذاشته و عمده‌تاً کاهش جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت به چشم می‌خورد (۸).

ورزش‌های هوایی قادرند تطبیق فیزیولوژیکی در کارایی سیستم انرژی هوایی ایجاد نموده، توانایی عملکردی فرد را افزایش داده و حتی در شرایط پیشرفت بیماری، ظرفیت عملکردی را بهبود بخشند (۹). از دیگر مزایای ورزش‌های منظم هوایی می‌توان به افزایش قدرت جسمانی، بهبود وضعیت بدن و کاهش خستگی اشاره کرد. انجام تمرینات بدنی هوایی استقلال فرد را افزایش می‌دهد و نه تنها منجر به بهبود کیفیت زندگی می‌گردد بلکه بر تعادل فرد و هماهنگی اندام‌های فوقانی و تحتانی تأثیر مثبت می‌گذارد (۹).

عروقی و تنفسی و آرتربیت بودند و محدودیت در انجام ورزش‌های جسمانی داشتند) ۱۵ فرد که واجد شرایط نبودند از مطالعه حذف شدند. قبل از شروع مداخله تمامی قوانین انجام ورزش‌های پیاده‌روی و یوگا و معیارهای ورود و خروج برای افراد شرکت کننده توضیح داده شد افراد شرکت کننده بعد از قبول قوانین مطالعه وارد این طرح شدند. در نهایت ۶۰ نفر جهت انجام مداخله باقی ماندند. ابتدا طی جلسه‌ای داوطلبان شرکت در این طرح با نوع طرح، اهداف و روش اجرای آن به طور کتبی و شفاهی آشنا شدند. به داوطلبان اطمینان داده شد که اطلاعات دریافتی از ایشان کاملاً محترمانه خواهد ماند و جهت بررسی داده‌ها از کد گذاری استفاده خواهد شد. ضمناً در این جلسه رضایت نامه شرکت در طرح توسط افراد نمونه امضاء شد. سپس جهت سنجش متغیرهای دموگرافیک پژوهش از پرسشنامه‌ای که روایی آن توسط ۱۵ استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأیید شده بود، استفاده شد. جهت تأیید پایایی، ابزار در اختیار ۱۰ نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ قرارداده و تکمیل شد و بعد از دو هفته مجلداً توسط آنها تکمیل شد و ضریب همبستگی آن محاسبه شد که پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت ($r > 0.90$, $p < 0.05$). پرسشنامه حاوی ۱۵ سوال (۴ سوال درمورد اطلاعات سنی و جنسیت- ۶ سوال درمورد تاریخچه دیابت- ۵ سوال درمورد تاریخچه ورزش کردن) بود. جهت سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 استفاده شد. این پرسشنامه توسط منتظری و همکاران در جهاد دانشگاهی تهران بومی سازی شده است و روایی و پایایی آن به اثبات رسیده است (۱۷).

پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 یک پرسشنامه استاندارد ۳۶ سوالی است. این پرسشنامه دارای ۲ مؤلفه کلی سلامت جسمی و سلامت روانی و در ۸ بعد مرتبه به سلامت جسمی و روانی به ارزیابی کیفیت زندگی افراد می‌پردازد. مؤلفه سلامت جسمی خود شامل ۴ بعد عملکرد جسمانی - نقش‌های

معنی‌داری داشته است (۱۶). با توجه به افزایش روزافرونه بروز و شیوع دیابت و اهمیتی که تأثیر این بیماری بر روی تمام ابعاد کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت دارد، انجام این مطالعه می‌تواند ضمن روشن نمودن تغییرات کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت، زمینه را برای ارتقاء کیفیت زندگی مبتلایان فراهم آورد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر انجام ورزش‌های پیاده‌روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با طراحی سه گروهی می‌باشد. این پژوهش از خرداد تا تیر ماه سال ۱۳۹۱ در شهر قزوین انجام شد.

در ابتدا لیستی از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی تهیه شد. طبق فرمول نمونه‌گیری زیر، تعداد افراد پژوهش در هر گروه ۲۰ نفر محاسبه شد. اما به دلیل احتمال ریزش، این تعداد به ۲۵ نفر در هر گروه افزایش داده شد لذا از ۷۵ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه و خواستار شرکت در مطالعه به صورت تصادفی ساده با استفاده از روش شماره‌های اتفاقی (قرعه کشی) ثبت نام به عمل آمد.

$$n = \frac{2 \left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + z_{1-\beta} \right)^2 \delta^2}{d^2}$$

سپس با توجه به معیارهای ورود (افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با رده سنی ۳۰-۵۵ سال که از قرص متغورمین ۵۰۰ میلی گرم یا گلی بن کلامید ۵ میلی گرم استفاده می‌کردند و فرم رضایت نامه را امضا کرده بودند) و معیارهای خروج (افرادی که به اجبار از انسولین استفاده کردند، در بیمارستان بستری شدند و افرادی که مبتلا به بیماری‌های عضلانی - اسکلتی و قلبی -

انجام شد. تمرینات هر دو گروه توسط مربی در سالن و دسته جمعی و به صورت دو گروه مردان و زنان انجام شد. در هر سه گروه قبل و بعد از برنامه ورزشی ۴ هفته‌ای پرسشنامه کیفیت زندگی تکمیل شد. اطلاعات مربوط به قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون‌های Paired Anova - LSD و t test استفاده شد. کلیه آزمون‌های آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شده است ($P<0.05$).

یافته‌ها

نتایج نشان داد که میانگین سنی در سه گروه 46 ± 8 سال بود. است که تفاوت معنی‌داری بین آنها مشاهده نشد ($P=0.793$). از ۶۰ نفر افراد مورد مطالعه ۲۵ نفر (۴۱٪ درصد) مرد و ۳۵ نفر (۵۸٪ درصد) زن بودند. در مقایسه جنس در سه گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ($p=0.937$) (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه سن و جنس در سه گروه

گروه	سن		
	میانگین و انحراف معیار	تعداد مرد	تعداد زن
بوجا	۴۷/۶±۶/۲۱	(٪۴۰) ۱۲	(٪۶۰) ۸
پیاده روی	۴۵/۸±۱۰/۰	(٪۴۰) ۱۲	(٪۶۰) ۸
کترل	۴۶/۹±۷/۸	(٪۴۵) ۱۱	(٪۵۵) ۹
مقدار احتمال سه گروه	۰/۷۹۳	۰/۹۳۷	

نشد ($P>0.05$). یافته‌های حاصل از آزمون تی زوجی نشان داد که بین میانگین قبل از مداخله و بعد از مداخله در گروه بوجا در ابعاد عملکرد جسمانی- نقش جسمانی- سلامتی عمومی و نقش روانی اختلاف معنی‌داری وجود داشت ($P<0.05$). در گروه پیاده روی تفاوت میانگین در ابعاد نقش جسمانی- سلامتی عمومی- سرزندگی و نقش روانی بعد از مداخله معنی دار بود ($P<0.05$) (جدول ۲).

جسمانی- درد جسمی و سلامتی عمومی است. مؤلفه سلامت روانی خود شامل ۴ بعد سرزندگی- عملکرد اجتماعی- نقش روانی و سلامت روانی می‌باشد. افراد شرکت کننده به صورت قرعه‌کشی به سه گروه پیاده روی، بوجا و کترل تقسیم شدند. برنامه آموزشی و قوانینی که برای گروه پیاده روی ثبت شده بود به شرح زیر بود:

پیاده روی را باید بعد از خوردن صبحانه به مدت ۳۰ روز و روزانه در نوبت صبح به مدت ۴۵ دقیقه انجام دهنند. در طول پیاده روی اجازه خوردن غذا و تنقلات به جز آب را نداشتند، همچنین اجازه گوش کردن موسیقی را هم نداشتند (به دلیل عدم وجود شرایط محیطی یکسان در دو گروه). برنامه آموزشی ای که برای گروه بوجا مطرح کرده بودیم به شرح زیر بود: باید تمرینات بوجا بعد از صبحانه، در ۳۰ روز و روزانه صبح‌ها به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌شد. ۳ مدل تمرین تنفسی ۱۰ دقیقه‌ای- کششی ۲۰ دقیقه‌ای- تمرکزی ۱۵ دقیقه‌ای بوجا

در گروه بوجا بیشتر افراد (۳۵ درصد) تحصیلاتی در حد دیپلم داشتند. در دو گروه پیاده روی (۳۰ درصد) و کترل (۴۰ درصد) بیشتر افراد تحصیلاتی در حد ابتدایی داشتند، البته در مقایسه سطح تحصیلات در سه گروه تفاوت آماری مشاهده نشد ($P=0.765$).

در بررسی داده‌های قبل از مداخله و بعد از مداخله ابعاد ۸ کانه در سه گروه در ابتدای مداخله تفاوت معنی‌داری مشاهده

جدول ۲: مقایسه میانگین ابعاد ۸ گانه کیفیت زندگی در سه گروه در قبل و بعد از مداخله

ابعاد	گروه									
	پیاده روی					یوگا				
	کنترل	میانگین قبل از مداخله	میانگین بعداز مداخله	مقدار احتمال	میانگین قبل از مداخله	میانگین بعداز مداخله	مقدار احتمال	میانگین قبل از مداخله	میانگین بعداز مداخله	مقدار احتمال
عملکرد جسمانی	۰/۲۵۹	۲۶/۶۶±۴۴/۲۵	۲۹/۹۹±۴۹/۵۰	۰/۰۵۷	۱۵/۲۳±۸۵/۸۳	۲۱/۵۹±۷۵/۰۰	۰/۰۳۵	۲۵/۵۴±۷۰/۰۰	۲۷/۸۹±۵۹/۰	
	۰/۰۶۰	۳۳/۷۱±۲۸/۷۵	۳۷/۴۶±۵۹/۲۱	۰/۰۰۲	۲۵/۹۹±۸۳/۷۵	۳۸/۲۸±۵۸/۷۵	<۰/۰۰۱	۲۴/۹۶±۷۶/۲۵	۳۴/۶۷±۴۶/۲۵	نقش جسمانی
درد جسمانی	۰/۴۱۲	۱۲/۶۰±۴۷/۰۰	۱۸/۴۸±۴۴/۵۰	۰/۰۹۶	۱۲/۶۸±۴۸/۵۰	۱۰/۴۶±۴۶/۰۰	۰/۰۸۱	۱۲/۰۸±۴۲/۵۰	۹/۲۳±۴۳/۰۰	
	۰/۲۶۸	۱۱/۹۷±۴۲/۵۰	۱۵/۵۰±۴۵/۰۰	۰/۰۳۶	۱۵/۴۳±۶۷/۲۵	۱۳/۲۰±۶۱/۷۵	۰/۰۳۸	۱۶/۸۹±۶۵/۷۵	۱۶/۸۹±۵۷/۵۰	سلامتی عمومی
سر زندگی	۰/۵۸۵	۱۱/۶۲±۵۵/۰۰	۲۵/۶۲±۵۲/۲۵	۰/۰۳۰	۹/۳۱±۷۰/۰۰	۲۷/۳۶±۵۵/۲۵	۰/۱۲۸	۱۱/۶۳±۶۲/۲۵	۱۷/۲۳±۵۴/۵۰	
	۰/۳۲۳	۱۳/۱۲±۵۶/۸۷	۱۶/۹۱±۷۰/۰۰	۰/۰۵۳۶	۲۰/۷۱±۶۶/۲۵	۲۳/۱۱±۶۳/۱۲	۰/۰۵۶	۲۵/۹۶±۷۵/۰۰	۲۹/۳۲±۶۴/۳۷	عملکرد اجتماعی
سلامت روانی	۰/۲۶۷	۳۷/۸۹±۳۸/۳۳	۳۹/۶۹±۴۸/۳۳	۰/۰۰۱	۳۶/۰۰±۸۱/۶۶	۳۷/۳۰±۶۵/۳۳	۰/۰۲۴	۲۸/۳۵±۷۵/۰۰	۴۵/۲۴±۵۰/۰۰	
	۰/۰۶۷	۱۰/۹۷±۴۵/۸۰	۲۰/۸۶±۵۸/۲۰	۰/۰۳۷۸	۱۲/۷۰±۳۳/۰۰	۱۹/۷۰±۵۹/۸۰	۰/۲۳۷	۱۳/۰۴±۳۴/۵۰	۱۷/۰۴±۵۵/۰۰	سلامت روانی

عمومی- سر زندگی و نقش روانی تفاوت معنی‌دار داشتند ($P<0/05$).

در بررسی همزمان ابعاد ۸ گانه کیفیت زندگی ابتدا و انتهای مداخله در سه گروه، در میانگین ابعاد عملکرد جسمانی- نقش جسمانی- سلامتی عمومی- سر زندگی- عملکرد اجتماعی- نقش روانی و سلامت روانی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد ($P<0/05$ ، اما در میانگین بعد درد تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد ($P>0/05$) (جدول ۳).

در مقایسه ابعاد ۸ گانه بین دو گروه یوگا و پیاده‌روی، در میانگین بعد عملکرد جسمانی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد که به نفع گروه یوگا بود و همچنین در میانگین بعد سر زندگی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد که به نفع گروه یوگا پیاده‌روی بود ($P<0/05$). در مقایسه ابعاد ۸ گانه در گروه یوگا با گروه سلامتی عمومی- سر زندگی و نقش روانی تفاوت معنی‌دار داشتند ($P<0/05$) و در مقایسه گروه پیاده‌روی و گروه کنترل، میانگین ابعاد عملکرد جسمانی- نقش جسمانی- سلامتی عمومی- سر زندگی و نقش روانی تفاوت معنی‌دار داشتند ($P<0/05$) (جدول ۳).

جدول ۳: بررسی همزمان ابعاد ۸ گانه کیفیت زندگی انتهای مداخله در سه گروه

ابعاد					
		میانگین مکعبات	آماره F	مقدار احتمال	
عملکرد جسمانی	<۰/۰۰۰۱	۱۵/۰۲۱	۸۴۳۰/۸۴۱	۱۶۸۶۱/۶۸۱	بین گروه ها
			۵۴۳/۲۰۵	۲۹۸۷۶/۲۵۰	در گروه ها
				۴۶۷۳۷/۹۳۱	کل
نقش جسمانی	<۰/۰۰۰۱	۲۱/۹۱۲	۱۷۷۹۱/۶۶۷	۳۵۵۸۳/۳۳۳	بین گروه ها
			۸۱۱/۹۵۲	۴۶۲۸۱/۲۵۰	در گروه ها
				۸۱۸۶۴/۵۸۳	کل
درد جسمانی	۰/۲۹۳	۱/۲۵۶	۱۹۵/۰۰۰	۳۹۰/۰۰۰	بین گروه ها
			۱۵۵/۲۶۳	۸۸۵۰/۰۰۰	در گروه ها
				۹۲۴۰/۰۰۰	کل
سلامتی عمومی	<۰/۰۰۰۱	۱۸/۰۲۸	۳۷۱۲/۹۱۷	۷۴۲۵/۸۳۳	بین گروه ها
			۲۰۰/۳۹۵	۱۱۴۲۲/۵۰۰	در گروه ها
				۱۸۸۴۸/۳۳۳	کل
سرزندگی	<۰/۰۰۰۱	۹/۴۰۱	۱۱۲۵/۴۱۷	۲۲۵۰/۸۳۳	بین گروه ها
			۱۱۹/۷۱۵	۶۸۲۳/۷۵	در گروه ها
				۹۰۷۴/۵۸۳	کل
عملکرد اجتماعی	۰/۰۲۷	۳/۳۶۴	۱۶۴۳/۲۲۹	۳۲۸۶۴/۴۵۸	بین گروه ها
			۴۲۵/۳۰۲	۲۴۲۴۲/۱۸۸	در گروه ها
				۲۷۵۲۸/۶۴۶	کل
نقش روانی	<۰/۰۰۰۱	۹/۴۲۸	۱۰۸۸۸/۸۸۹	۲۱۷۷۷/۷۷۸	بین گروه ها
			۱۱۵۴/۹۷۱	۶۵۸۳۳/۳۳۳	در گروه ها
				۸۷۶۱۱/۱۱۱	کل
سلامت روانی	۰/۰۰۳	۶/۳۷۲	۹۶۰/۲۶۷	۱۹۲۰/۵۳۳	بین گروه ها
			۱۵۰/۷۰۹	۸۵۹۰/۴۰۰	در گروه ها
				۱۰۵۱۰/۹۳۳	کل

نتایج پژوهش حاضر همچنین با نتایج مطالعه کرامر (Cramer) در سال ۲۰۱۳ همخوانی دارد (۱۸). یوگا با افزایش توان سازگاری دستگاههای روانی- عصبی- ایمنی، تعديل سیستم عصبی خودکار، افزایش پایداری جسمانی و مقاومت بدن و تعديل سیستم ایمنی بر افزایش کیفیت زندگی و احساس سلامت کل بدن تأثیر می‌گذارد (۱۲). تمرینات جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف پذیری و قدرت عضلاتی را افزایش داده، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم

بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که انجام ۴ هفته فعالیت ورزشی یوگا موجب بهبود کیفیت زندگی در ابعاد عملکرد جسمانی و نقش جسمانی نسبت به گروه کنترل می‌شود. در مطالعه جیوتسانا (Jyotsna) در سال ۲۰۱۲ نیز ورزش یوگا روی ۴۹ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ به مدت ۶ ماه انجام شد و نتایج نشان داد که میانگین ابعاد عملکرد جسمانی و نقش جسمانی حدود ۳ نمره افزایش پیدا کرده است که از لحاظ آماری معنی دار بود (۱۶).

در مطالعه حاضر میانگین نمرات کیفیت زندگی در ابعاد عملکرد جسمانی و نقش جسمانی در گروه پیاده‌روی افزایش با توجه به این نتایج می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فاکتورهای روانی اغلب به صورت افسردگی- استرس و رفتارهای خود مراقبتی توصیف می‌شوند و اغلب افراد مبتلا به دیابت به علت داشتن روند مزمن بیماری دیابت، نامید هستند و روز به روز سطح اداره سلامتی بر خود را کمتر می‌کنند، که این واقعه منجر به استرس و افسردگی آنها می‌شود که در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی آنها می‌شود (۱۶). به نظر می‌رسد علت معنی‌دار نبودن سلامت روانی، ناکافی بودن مدت مداخله جهت تغییر در بعد سلامت روانی بوده باشد.

میانگین بعد نقش روانی در گروه پیاده‌روی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت به طوری که این افزایش نسبت به گروه یوگا بسیار بیشتر بود ولی نمره بعد سلامت روانی نسبت به گروه کنترل معنی‌دار نبود. در مطالعه Reid (در سال ۲۰۱۰ ۲۱۸ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ ورزش هوایی انجام دادند. میانگین دو بعد سلامت روانی و نقش روانی بعد از ۲۲ هفته ورزش هوایی افزایش داشت. نتیجه پژوهش حاضر با نتایج مطالعات تادیبی در سال ۲۰۱۲ (۱۹)، کریمیان در سال ۲۰۱۱ (۲۱)، نیکولوکسی Nicolucci) در سال ۲۰۱۲ (۲۵) همخوانی دارد، در حالی که در مطالعه تای Tai (در سال ۲۰۱۱ ۲۶) که روی ۶۰ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ که بیشتر از ۵۸ سال سن داشتند انجام شد، میانگین دو بعد سلامت روانی و نقش روانی پس از ۸ هفته افزایش معنی‌داری نشان نداد. به طور کلی نقش پیاده روانی در افزایش امواج آلفا در مغز اثبات شده است. این امواج الگوی الکتریکی فعالیت مغز می‌باشند که نشان دهنده آرامش ذهنی فرد است. پیاده روانی منظم آنдрوفین‌ها را که باعث احساس مثبت در فرد می‌شود در خون وارد می‌کنند، این ماده

هورمونی را بهبود می‌دهد و در نهایت باعث بهبود عملکرد جسمانی و نقش جسمانی می‌شود (۶،۱۲). معنی‌دارتری نسبت به گروه کنترل داشت. در گروه یوگا تفاوت در ابعاد عملکرد جسمانی و نقش جسمانی نسبت به گروه کنترل بیشتر از گروه پیاده‌روی معنی‌دار بود. در مطالعه تادیبی در سال ۲۰۱۲ (۱۹) که روی ۵۲ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد، بدنبال انجام ۸ هفته ورزش هوایی، بهبود میانگین نمرات عملکرد جسمانی و نقش جسمانی در گروه ورزش بیش از ۵۰ نمره گزارش شد. نتیجه پژوهش حاضر با نتایج مطالعات رندال (Randall) در سال ۲۰۰۹ (۹)، مایرز Myers (در سال ۲۰۱۳ (۲۰) و کریمیان در سال ۲۰۱۱ (۲۱) نیز همخوانی دارد.

تأثیر مثبت فعالیت بدنی در بهبود سلامت جسمی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ممکن است مربوط به اثرات تمرین هوایی در ساختار و بیوشیمی عضلات و اسکیژن مصرفی بیشتر و در نتیجه تغییرات مطلوب همراه با آن و بهبود فرآیند حمل گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین باشد. در نهایت فرد مبتلا به دیابت نیاز کمتری به انسولین خواهد داشت، ورزش‌های هوایی باعث فعال سازی سیستم عصبی مرکزی و ترشح اندروفین‌ها (۲۲) می‌شوند. بنابراین تمرین هوایی بر بهبود حساسیت به انسولین و کنترل بهتر بیماری در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تأثیرگذار است (۱۹).

در مطالعه حاضر در میانگین نمرات ابعاد سلامت روانی و نقش روانی در گروه یوگا نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار مشاهده شد. در مطالعه Lee (در سال ۲۰۰۴ (۲۳) که روی ۱۶۸ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شده بود، میانگین نمرات سلامت روانی و نقش روانی حدود ۱۵ نمره افزایش داشت. جیوتستا (۱۶) نیز افزایش میانگین دو بعد سلامت روانی و نقش روانی را پس از انجام ورزش گزارش کرده است.

را نسبت به گروه کنترل نشان داد. در مطالعه Reid (Reid) در سال ۲۰۱۰ (۲۴) تفاوت میانگین بعد سلامتی عمومی پس از ۲۲ هفته ورزش هوایی معنی دار نبود. همچنین در مطالعه تادیبی (۱۹) که روی ۵۲ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲، ۸ هفته ورزش هوایی به مدت ۴۵ دقیقه ۳ بار در هفته انجام شد میانگین سلامتی عمومی اگرچه ۹ نمره افزایش داشت، ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. این نتیجه با نتایج مطالعات کرامر (۱۸)، مایر (۲۰) و کریمیان (۲۱) همخوانی دارد.

مطالعات بسیاری ثابت کرده‌اند که یوگا و پیاده روی می‌توانند در داراء بیماری‌های مزمن مثل فشارخون، آسم، دیابت و عوارض مربوط به دیابت ملیتوس نوع ۲ (۲۹،۱۶) نقش مؤثری را داشته باشند. کنترل بیماری در افراد مبتلا به دیابت باعث حل چالش بزرگی در زندگی این افراد خواهد شد که در نتیجه موجب افزایش بعد سلامت عمومی خواهد شد (۱۶).

در مطالعه حاضر گروه سنی ۴۶ سال از بیشترین افراد مبتلا به دیابت برخوردار بود، که با مطالعه حقدوست در سال ۲۰۰۹ (۳۰) که سنین بین ۴۰-۶۰ سال به عنوان بیشترین گروه سنی شامل افراد مبتلا به دیابت ذکر کرده بود، همخوانی دارد. مطالعه‌ای که توسط محمدی در سال ۱۳۹۰ (۳۱) انجام شد، نشان داد که شیوع دیابت در کسانی که سن بالای ۷۰ سال دارند تقریباً ۳ برابر کسانی است که سن ۶۵-۳۵ سال دارند. تحقیقات نشان داده‌اند که با افزایش سن، فرد دچار کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش وزن می‌شود و در نتیجه باعث کاهش فعالیت انسولین بدن شده و مقاومت به انسولین ایجاد می‌شود (۳۱).

در مطالعه حاضر در هر سه گروه تعداد خانم‌ها بیشتر از آقایان بود. این نتایج با نتایج مطالعه عظیمی نژاد در سال ۲۰۰۸ (۵) که شیوع دیابت را در بین زنان ۵/۸ درصد و مردان ۵/۱ درصد ذکر کرده بود، همخوانی دارد. در مطالعه حقدوست در سال ۲۰۰۹ (۳۰) میزان شیوع دیابت در زنان ۱/۷ درصد

خاصیت آرام بخشی دارد و باعث قطع درد و حالت سرور در فرد می‌شود بنابراین در بهبود سلامت روانی و نقش روانی بسیار موثر است (۲۷). تفاوت در دامنه سنی واحدهای مورد بررسی می‌تواند علت این عدم همخوانی با مطالعه تای (۲۶) باشد.

در مطالعه حاضر تفاوت میانگین بعد سر زندگی در گروه یوگا نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. در مطالعه آگراوال (Agrawal) در سال ۲۰۰۳ (۲۸) که بر روی ۱۵۴ فرد مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد، میانگین بعد سر زندگی بعد از ۳ ماه ورزش یوگا به میزان ۱۷ نمره افزایش داشت. همچنین این نتیجه با نتیجه مطالعه راس (Ross) در سال ۲۰۱۰ (۱۳) همخوانی دارد.

به دلیل اینکه تمرينات وضعیتی یوگا باعث افزایش سطح انرژی و کاهش خستگی فرد می‌شود، می‌توان از آن به منظور سرزنش ترکدن بیماران مبتلا به دیابت هم استفاده کرد (۲۳). در مطالعه ما تفاوت میانگین بعد سر زندگی در گروه پیاده روی نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری نسبت به گروه یوگا داشت. در مطالعه شهرجردی در سال ۲۰۱۰ (۱) نیز میانگین بعد سر زندگی در بین ۱۸ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ بعد از ۸ هفته ورزش هوایی افزایش داشت. همچنین نتیجه پژوهش حاضر با نتایج مطالعات کریمیان (۲۱)، احمدی در سال ۲۰۱۱ (۱۴) همخوانی دارد.

ورزش پیاده روی باعث افزایش نور اپی نفرین، سنتز سروتونین و افزایش آندروفین‌ها می‌شود که این عوامل همگی در ایجاد سرزنشگی و جلوگیری از بروز خستگی فرد مبتلا به دیابت تأثیرگذار هستند (۱۰). پیاده روی به انسان انرژی می‌دهد تا احساس آرامش کند و از سرزنشگی و شادابی خود لذت ببرد (۲۷).

در این پژوهش گرچه در گروه پیاده روی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری در بعد سلامتی عمومی دیده شد ولی گروه یوگا در مقایسه با گروه پیاده روی افزایش بیشتری

شود و از سویی دیگر به دلیل استفاده فراوان ورزش پیاده روی و در دسترس و رایگان بودن این ورزش، نویسنده‌گان چنین نتیجه‌گیری می‌نمایند که ۴ هفته تمرینات یوگا و پیاده روی باعث بهبودی ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ می‌شود و بایستی در آموزش‌های بیماران مدد نظر قرار گیرد. اگرچه ورزش یوگا در ارتقاء بعد سلامت عمومی کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش پیاده‌روی بود ولی ورزش پیاده‌روی در بهبود سایر ابعاد کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش یوگا بود.

جهت تعیین نتایج پژوهش به جامعه بزرگتر نویسنده‌گان انجام مطالعه‌ای مشابه با تعداد نمونه بیشتر و زمان مداخله طولانی‌تر را پیشنهاد می‌کنند.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شماره مجوز ۳۶۵۹/۶/۶ و با عنوان «بررسی مقایسه تأثیر ورزش‌های یوگا و پیاده‌روی بر میزان قند خون ناشتا، تعداد قرص مصرفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو» می‌باشد، بر خود لازم می‌دانیم از معاونت پژوهشی دانشگاه، از کانون یوگای پیام دل استان قزوین و تمامی افراد مبتلا به دیابت که در این پروژه شرکت کردند کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشیم.

بیشتر از مردان بوده است. به نظر می‌رسد بیشتر بودن دیابت در زنان به علت سبک زندگی زنان ایرانی است، چون بیشتر وقت خود را در خانه می‌گذرانند و حداقل فعالیت فیزیکی را دارند و همچنین به دلیل بیشتر داشتن توده بدنی، مستعد ابتلاء به دیابت هستند (۱۲، ۳۰).

در این مطالعه بیشتر افراد تحصیلات ابتدایی داشته‌اند که با مطالعه عظیمی نژاد (۵) که شیوع دیابت را در افراد کم سواد بیشتر ذکر کرده است همخوانی دارد. به نظر می‌رسد به دلیل کاهش دانش در رابطه با پیشگیری یا درمان دیابت و دیگر بیماری‌ها، دیابت در این سطح تحصیلات بیشتر است (۱۲). به طور کلی می‌توان گفت فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار سلامتی عمومی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی مثل افسردگی و اضطراب از آن بهره برد. تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که فعالیت جسمی منظم در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ دارای اثر حفاظتی می‌باشد. انجام فعالیت‌های بدنی و فیزیولوژیک از مزایای روانی، احساسی، عاطفی و اجتماعی برخوردار است. با انجام ورزش ظرفیت اکسیداسیون اعضلات افزایش یافته و در نتیجه سیستم بیوشیمیابی هوایی جهت ایجاد انطباق، تحریک گردیده و باعث افزایش میزان اکسیژن دریافتی در بدن می‌شود. از آنجایی که در ورزش یوگا، تمامی مفاصل در حد کامل استفاده می‌شوند و یوگا نقش مهمی را در کاهش استرس و رسیدن به آرامش عمومی از طریق تنفس‌های منظم و بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند، این نوع ورزش می‌تواند برای مبتلایان به دیابت مفید واقع

منابع

- 1- Shahrjerdi Sh, Shavandi N, Sheikh Hoseini R. The effect of aerobic exercise on metabolic factors, quality of life (QOL) and mental health (MH) in women with type II diabetes. AMUJ. 2010; 12(4): 25-35. [In Persian]

- 2- Monjamed Z, Ali asqharpoor M, Mehran A, Peimani T. The quality of life in diabetic patients with chronic complications. *hayat.* 2006; 12(1): 55-66. [In Persian]
- 3- Brunner, Suddarth .Textbook of Medical-Surgical Nursing (liver and metabolic endocrine). Asadi Nooqaby AA, Dehghan Nayeri N (Persian translator). 12 thed. Tehran. Jamee negar Pub; 2010: 155-66. [In Persian]
- 4- Sharma M, Adam P.Role of Yoga in Preventing and Controlling Type 2 Diabetes Mellitus. *J Complement Alternat Med.* 2012; 17(2): 88-95.
- 5- Azimi Nezhad M ,Ghayour-Mobarhan M, Parizadeh MR, et al. Prevalence of type 2 diabetes mellitus in Iran and its relationship with gender, urbanisation, education, marital status and occupation. *Singapore Med J.* 2008; 49(7): 571-76.
- 6- Innes KE,Vincent HK.The influence of yoga-based programs on risk profiles in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2007; 4(4): 469-86.
- 7- Graham JE, Stoebner-May DG, Ostir GV,et al. Health Related Quality Of Life In Older Mexican Americans With Diabetes: a cross-sectional study. *Health Qual Life Outcomes.* 2007; 5: 39.
- 8- Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, Moezzi F.The effect of empowerment model on quality of life of diabetic adolescents .*Iran J Pediatr.* 2007; 17(Suppl 1): 87-94.
- 9- Randall TS. The symptomatic management of multiple sclerosis. *Ann Indian Acad Neural.* 2009; 12(4): 291–95.
- 10- Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B ,et al. Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the AmericanDiabetes Association: joint position statement. *Diabetes Care.* 2010; 33(12): 147–67.
- 11- Yang K, Bernardo LM, Sereika SM, Conroy MB, Balk J, Burke LE. Utilization of 3-month yoga program for adults at high risk for type 2 diabetes: a pilot study. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2011; 2011: 257891.
- 12- Hadi Ne, Hadi Na. Effects of hatha yoga on well-being in healthy adults in shiraz, Islamic republic of iran. *East Mediterr Health J.* 2007; 13(4): 829-37.
- 13- Ross A, Thomas S. The health benefits of yoga and exercise: a review of comparison studies. *J Altern Complement Med.* 2010; 16(1): 3-12.
- 14- Ahmadi A, Hasanzadeh J, Rahimi M, Lashkari L. Effective factors in the quality of life of patients with type 2 diabetes in Chaharmahal & Bakhteyari province.*J North khorasan Univ Medi Sci.* 2011; 3(1): 7-13. [In Persian]
- 15- Alavi NM, Ghofranipour F, Ahmadi F, Emami A. Developing a culturally valid and reliable quality of life questionnaire for diabetes mellitus. *East Mediterr Health J.* 2007; 13(1): 177-85.

- 16- Jyotsna VP, Joshi A, Ambekar S, Kumar N, Dhawan A, Sreenivas V. Comprehensive yogic breathing program improves quality of life in patients with diabetes. Indian J Endocrinol Metab. 2012; 16(3): 423–28.
- 17- Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005; 14(3): 875-82.
- 18- Cramer H, Lauche R, Langhorst J, Dobos G, Paul A. Quality of Life and Mental Health in Patients with Chronic Diseases Who Regularly Practice Yoga and Those Who Do Not: A Case-Control Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013; 2013: 1-7.
- 19- Tadibi V, Bayat Z. J Gorgan .Effect of eight weeks aerobic training and drug intervention on quality of life in women with type 2 diabetes. J Gorgan Univ Med Sci. 2012; 14(2): 30-35.
- 20- Myers VH, McVay MA, Brashear MM, et al. Exercise Training and Quality of Life in Individuals With Type 2 Diabetes a randomized controlled trial. Daibetes Care. 2013; 36(7): 1884-90.
- 21- Karimian S, Mohebbi SH, Khosheh Mehri G. Assessmen Of Quality Of Life In Type 2 Diabetic And Effective Factors.Edrak. 2011; 5(21): 32-37. [In Persian]
- 22- Sardar M, Sohrabi M, Shamsian A, Aminzadeh R. Effects of aerobic exercise training on the mental and physical health and social functioning of patients with Type 2 diabetes mellitus. Iran J Endocrinol& Metab. 2009; 11(3): 251-56. [In Persian]
- 23- Lee SW, Mancuso CA, Charlson ME. Prospective study of new participants in a community-based mind-body training program. J Gen Intern Med. 2004; 19(7): 760-65.
- 24- Reid RD, Tulloch HE, Sigal RJ, et al. Effects of aerobic exercise, resistance exercise or both, on patient-reported health status and well-being in type 2 diabetes mellitus: a randomised trial. Diabetologia. 2010; 53(4): 632–40.
- 25- Nicolucci A, Balducci S, Cardelli P, et al. Relationship of exercise volume to improvements of quality of life with supervised exercise training in patients with type 2 diabetes in a randomised controlled trial.the Italian Diabetes and Exercise Study (IDES). Diabetologia. 2012; 55(3): 579–88.
- 26- Ng CL, Tai ES, Goh SY, Wee HL. Health status of older adults with Type 2 diabetes mellitus after aerobic or resistance training: a randomised trial. Health Qual Life Outcomes. 2011; 2(9): 59.
- 27- Eckert K. Impact of physical activity and bodyweight on health-related quality of life in people with type 2 diabetes .Diabetes Metab Syndr Obes. 2012; 5: 303-11.
- 28- Agrawal RP, Arad h, Sabir H, et al. Influence of Yogic Treatment On Quality Of Life Out Comes, Glycemic Control, and Risk Factors In Diabetes Mellitus: Randomized Controlled Trial. Explore. 2003; 23: 130-34.
- 29- Zinman B, Ruderman N, Campaigne BN, et al. Physical activity/exercise and diabetes mellitus. Diabetes Care. 2003; 26 (suppl 1): S73-7.

- 30- Haghdoost AA, Rezazadeh-Kermani M, Sadghirad B, Baradaran HR. Prevalence of type 2 diabetes in the Islamic Republic of Iran: systematic review and meta-analysis. Eastern Mediterr Health J. 2009; 15(3): 591-99.
- 31- Mohammadi M, Rashidi M, Afkhami Ardekani M. Risk Factors for Type 2 Diabetes. J Shahid Sadoughi Univ Medi Sci. 2011; 19(2): 266-80. [In Persian]

Comparing Effects of Walking and Yoga Exercise on Quality of Life in Patients with type 2 Diabetes

Azimi H¹, YekkehFallah L², Ghorbani A³

¹MSc. Student Dept. of medical surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

²Assistant professor. Dept. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

³MSc. Dept of Nursing, Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin,Iran

Corresponding Author: Dept. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Email: h.Azimi88@yahoo.com

Received: 17 May 2014 **Accepted:** 31 Aug 2015

Background and Objectives: Diabetes, as a chronic disease, needs self-management efforts. It is shown that having a regular exercise can lead to an increase in quality of life among patients with chronic diseases. The aim of this study was to compare the effect of yoga exercise with walking on quality of life among patients with type 2 diabetes.

Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 60 patients with type 2 diabetes aged 30-55 years. The participants were randomly assigned into three: yoga, walking and control groups. Patients in the yoga and walking groups, had 45-minutes daily exercise for four weeks. Data were gathered using the SF-36 quality of life questionnaire and were analyzed using the one-way ANOVA in the SPSS-16.

Results: There were significant differences between the yoga and control groups after the intervention in terms of physical function, physical role, general health, vitality living, social function, mental role and mental health of the quality of life dimensions ($P<0/05$). There were significant differences between walking and control groups after the intervention in terms of physical function, physical role, general health, vitality living, mental role and mental health of the quality of life dimensions ($P<0/05$). Repeated measure ANOVA showed significant differences in terms of physical function, physical role, general health, vitality living, mental role and mental health of the quality of life dimensions in the three groups ($P<0/05$).

Conclusion: According to the results of or study, yoga exercise was more effective in improving general health dimension of the quality of life.

Key words: *yoga, walking, exercises, quality of life, diabetes mellitus, Iran*

Please cite this article as follows:

Azimi H, YekkehFallah L, Ghorbani A. Comparing Effects of Walking and Yoga Exercise on Quality of Life in Patients with type 2 Diabetes. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal (PCNM); 2015: 5(1): 46-58.
